

## КОЛЛЕКЦИИ

УДК2.2+572.225(477)

© Л. И. Крицкая, Н. М. Федорончук, М. В. Шевера

ТИПЫ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА *LILIACEAE* S. L. В ГЕРБАРИИ  
ИНСТИТУТА БОТАНИКИ ИМ. Н. Г. ХОЛОДНОГО НАН УКРАИНЫ (KW)L. I. KRYTZKA, N. M. FEDORONCHUK, M. V. SHEVERA. COLLECTION OF TYPES  
OF *LILIACEAE* S. L. SPECIES KEPT IN THE HERBARIUM OF THE M. G. KHOLODNY  
INSTITUTE OF BOTANY, NAS OF UKRAINE (KW)Институт ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины  
01601 Киев-1, ул. Терещенковская, 2

Тел. (38-044) 235-2038, факс (38-044) 224-1064

E-mail-1: inst@botan.kiev.ua; e-mail-2: shevera@mail.ru

Поступила 28.11.2000

Окончательный вариант получен 23.05.2002

Проведена типификация и составлен список типовых образцов (голотип, изотип, лектотип, неотип) видов сем. *Liliaceae* s. l., хранящихся в Гербарии Института ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины (KW).

Ключевые слова: тип вида, голотип, лектотип, неотип, *Liliaceae*, Гербарий Института ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины (KW).

В Гербарии Института ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины (KW) с 1999 г. проводится изучение типов видов, описанных с территории Украины. В статье приводится список хранящихся в KW типовых образцов (27) видов сем. *Liliaceae* s. l., описанных с территории Украины и из других регионов. Для каждого вида указываются литературная цитата, категория типа, фамилия исследователя, выделившего лектотип или неотип в гербарии, оригинальный текст гербарной этикетки и критические заметки (в случае необходимости).

*Liliaceae* Adans.*Allium* L.

1. *A. albiflorum* Omelcz. 1962, Укр. бот. журн. 19, 2 : 19; Омельч. 1979, во Фл. Европ. части СССР, 4 : 268.

Holotypus: «Крымская обл., Ялтинский р-н, гора Ай-Петри, яйла, у подножия зубцов северной стороны, 18 VI 1959, Н. Глаголева» (KW).

2. *A. auctum* Omelcz. 1962, Укр. бот. журн. 19, 2 : 22; Омельч. 1979, во Фл. Европ. части СССР, 4 : 275.

Holotypus: «Крымская обл., Судакский р-н, Карадаг, гора Святая, лес на вершине горы, 24 V 1941, М. Котов» (KW).

3. *A. condensatum* Turcz. 1854, Bull. Soc. Nat. Moscou, 27, 2 : 121; Введ. 1935, во Фл. СССР, 4 : 182; Череп. 1995, Сосуд, раст. Росс, и сопред. госуд.: И.

Isotypus: «In pratis Mongoliae Chinensis. 1831» (KW).

4. *A. flavescens* Bess. 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 56; Омельч. 1979, во Фл. Европ. части СССР, 4 : 272.

Lectotypus (Shevera, hoc loco): «*Allium flavescens* Bess. Podolia» (KW).

5. *A. monadelphum* Less. ex Kunth., 1843, Enum. Pl. 4 : 393; Введ. 1935, во Фл. СССР, 4 : 189; Череп. 1995, Сосуд, раст. Росс, и сопред. госуд.: 12.

Isotypus: «*M. sabinenses*» (KW).

6. *A. perversitum* Klok. 1950, во Фл. УРСР, 3:406, 110; Омельч. 1979, во Фл. Европ. части СССР, 4 : 268.

Holotypus: «Солонці в заплавіні р. Молочної проти села Мордвиновки Якимівський р-н, Зап. обл., 19 V 1932, Г. Білик» (KW).

7. *A. scythicum* Zoz, 1936, Уч. зап. Харк. ун-ту, 4 : 65; Омельч. 1979, во Фл. Европ. части СССР, 4 : 269.

Neotypus (Krytzka, hoc loco): «Херсонская обл., Аскания-Нова, Успенская степь, под Джамбек, 22 VI 1931, М. Дика» (KW).

Примечание. Прочитированный в протологе тип: «р-п „Червоний Чабан“, „Солоний Під“, на південь від заповідника „Чапли“, 2 VI 1932, М. Клоков», хранившийся в Гербарии Харьковского университета (CWU), отсутствует, вероятно утрачен.

8. *A. sphaeropodium* Klok. 1950, во Фл. УРСР, 3 : 405, 137; Омельч. 1979, во Фл. Европ. части СССР, 4 : 270.

Holotypus, isotypus: «Молдавська АССР. Черв. Окнянський р., с. Артирівка, вапнякові відслонення (сармат), по б. Городищі, 13 VII 1934, Г. Клеоров» (KW) (Sub *Allium flavum* L. (verum!)).

9. *A. ursinum* L. subsp. *ucrainicum* Kleor. ex Oхner, 1935, в Списке Росл. Герб. Фл. УРСР, № 37 : 10. — *A. ucrainicum* (Клеор. ex Охнер) Bordz. 1950, во Фл. УРСР, 3 : 143; Череп. 1995, Сосуд, раст. Росс, и сопред. госуд.: 15, pro syn. *A. ursinum* L.

Holotypus: «Київська обл., Смілянський район, с. Сунки, в грабовій діброві, 17 V 1924, Ю. Клеопов» (KW).

10. *A. volhynicum* Bess. 1814, Cat. Pl. Hort. Cremen., Suppl., 3 : 2; Омельч. 1979, во Фл. Европ. части СССР, 4 : 273, pro syn. *A. strictum* Schrad.

Lectotypus (Fedoronchuk, hoc loco): «*Allium volhynicum* nobis in saxosis Cremenec» (KW).

### *Asparagus* L.

1. *A. brachyphyllus* Turcz. 1840, Bull. Soc. Nat. Moscou, 1 : 78; Череп. 1995, Сосуд, раст. Росс, и сопред. госуд.: 66.

Isotypus: «In China boreali. Legit Kuznetsoff. 1831» (KW).

### *Colchicum* L.

1. *C. fominii* Bordz. 1936, Feddes Repert. 40 : 373; Бордз. 1950, во Фл. УРСР, 3 : 77; Цвел. 1979, во Фл. европ. части СССР, 4 : 220.

Neotypus (Krytzka, hoc loco): «Одеська обл., Великомихайлівський район, посадка біля с. Гребенники, 19 IX 1999, С. Дятлов» (KW).

Примечание. Вид описан из окр. с. Гребенники, ранее входившего в состав Молдавской ССР: «Habitat in decliviis steposis in districtu Tiraspolensi reipublicae Moldaviae haud procul a pago Grebenniki. A cl. Buzczak-Abramowicz repertum est.». Этот же образец цитируется Е. Бордзиловским во «Флоре УРСР» (1950, цит. соч.): «Одеська обл., Великомихайлівський р-н, близько Гребенників, на степовому схилі в долині р. Кучургана в окол. Кардамичевого (Бурчак-Абрамович)». На данный экземпляр ссылается и Н. Н. Цвелёв во «Флоре европейской части СССР» (1979, 4: 220). В настоящее время в Гербарии KW типовой образец отсутствует, возможно утерян.

### *Gagea* Salisb.

1. *G. artemczukii* A. Krasnova, 1972, Укр. бот. журн. 29, 2 : 204; Краснова, 1987, в Опред. высш. раст. Укр.: 395.

Holotypus: «Запорізька обл., степові ділянки вздовж дороги Токмак—Мелітополь (окол. с. Долинівки), 25 IV 1969, А. Краснова» (KW).

2. *G. granulosa* Turcz. 1854, Bull. Soc. Nat. Moscou, 27, 2: 112; Гроссг. 1935, во Фл. СССР, 4: 71; Череп. 1995, Сосуд, раст. Росс, и сопред. госуд.: 584.

Isotypus: «Tomsk, in pratis, 1837» (KW).

3. *G. hypanica* Sobko, 1971, Укр. бот. журн. 29, 4: 438; Давлианидзе, 1979, во Фл. Европ. части СССР, 4: 230.

Holotypus: «Околиці м. Миколаїв (с. Старі Водопої), на степовому схилі, 3 IV 1968, V. Sobko» (KW).

4. *G. littoralis* Artemcz. 1940, Журн. Ін-ту. бот. АН УРСР, 23 (31): 63; Давлианидзе, 1979, во Фл. европ. части СССР, 4: 230, pro syn. *G. dubia* Terracino.

Holotypus: «Дніпропетровська обл., Бердянський р-н, Бердянська коса, ракушнякові схили, 23 IV 1937, Артемчук» (KW).

5. *G. maeotica* Artemcz. 1940, Журн. Ін-ту. бот. АН УРСР, 23 (31): 61; Давлианидзе, 1979, во Фл. европ. части СССР, 4: 226.

Лектотипус (Fedoronchuk, hoc loco): «Дніпропетровська обл., окол. м. Бердянська. Далекі Макорти. Глинясті схили до господарства РВК, 8 V 1938, leg. Артемчук» (KW).

Примечание. На одном из типовых экземпляров имеется Notae criticae: «Topotypus *Gagea maeotica* Artemczuk. 28 XII 1992. Teste I. Levichev».

6. *G. novoascanica* Klok. 1974, Нов. сист. высш. и низш. раст.: 98; Mosyakin et Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. Ukr.: 37.

Holotypus, isotypus: «Херсонська обл., Голопристанський р-н, Чорноморський заповідник. Урочище Ягорлицький кут, 25 IV 1970, В. Протопопова, О. Мринський» (KW).

7. *G. pineticola* Klok. 1936, Уч. зап. Харк. ун-ту, 4: 63; Давлианидзе, 1979, во Фл. европ. части СССР, 4: 228.

Neotypus (Shevera, hoc loco): «Харківська обл., Зміївський р-н, с. Тросне, Сосновий бір по р. Мжа, 18 IV 1949, М. Клоков» (KW).

Примечание. Цитируемый в протологе М. И. Клоковым тип вида: «Харків, ст. Мерефа Півд. зал. У малому борі по краю галявини коло озера, 05 V 1935, CWU» так же, как и исследованные им образцы, хранившиеся в Гербарии Харьковского университета (CWU), отсутствуют, вероятно утрачены. Не отип вида выбран из коллекции М. Клокова в Гербарии KW.

8. *G. praeciosa* Klok. 1956, во Фл. УРСР, 3: 405, 188; Давлианидзе, 1979, во Фл. европ. части СССР, 4: 228.

Holotypus: «УССР. Окр. г. Глухова, с. Годунівка, уроч. Килинів Куш. Схили прав. бер. р. Ясьмень, рендзини, 22 IV 1944, Д. Сакало» (KW).

9. *G. tesquicola* A. Krasnova, 1972, Укр. бот. журн., 29, 2: 200; Давлианидзе, 1979, во Фл. европ. части СССР, 4: 228, pro syn. *G. pusilla* (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. fil. subsp. *tesquicola* (A. Krasnova) Davlianidze.

Holotypus: «Запорізька обл., Якимівський р-н, Алтагір. Степовий схил до лиману Молочного, 19 IV 1969, А. Краснова» (KW).

10. *G. ucrainica* Klok. 1926, Укр. бот. журн. 3: 16, Давлианидзе, 1979, во Фл. европ. части СССР, 4: 225.

Holotypus: «местн. Купянский у., окр. города Купянска, пески в бору, 08 IV 1915, М. Клоков» (KW).

### *Muscari* Mill

1. *M. dolioliforme* Sobko, Укр. бот. журн. 1971, 28, 4: 439; Мякушко, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 398, pro syn. *M. neglectum* Guss.

Holotypus: «Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Мигія. На гранітних відслоненнях, 12 V 1968, V. Sobko» (KW).

### *Ornithogalum* L.

1. *O. erubescens* Bess. 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 45. — *Gagea erubescens* (Bess.) Schult. et Schult. fil. 1829, in Roem. et Schult. Syst. Veg., 7, 1 :545; Давлианидзе, 1979, во Фл. Европ. части СССР, 4 : 226.

Lectotypus, isotypus (Fedoronchuk, hoc loco): «E Podolia» (KW).

2. *O. melancholicum* Klok. ex A. Krasnova, 1970, Укр. бот. журн. 27, 5 :650—651; Агапова, 1979, во Фл. европ. части СССР, 4 : 246.

Holotypus: «Запорожская обл., окр. Бердянска, Дальние Макорты. Степные склоны, 22 V 1969, А. Краснова» (KW).

### *Polygonatum* L.

1. *P. macropodum* Turcz. 1832, Bull. Soc. Nat. Moscou, 5 : 205.

Holotypus: «In montosis lapidosis Chinae borealis» (KW).

Примечание. В протологе указано: «In rupibus Chinae borealis prope oppidum Kalgan. Junio m. lectum». В Гербарии LE (как в коллекции типов, так и в гербарии растений сектора Центральной Азии) нам не удалось обнаружить типовых образцов вида. Не указан он и в недавно опубликованном «Каталоге...» (2000).

### *Plecostygma* Turcz. ex Trautv.

1. *P. pauciflorum* Turcz. ex Trautv. 1844, in Trautv. Pl. Imag. Descr. Fl. Russ. 111. 1 : 8, tab. 2; Гроссг. 1935, во Фл. СССР, 4: 111, pro syn. *Gagea pauciflora* Turcz. ex Ledeb. (sine auct. Ledeb.); Череп., 1995, Сосуд, раст. Росс. и сопред. госуд.: 585, pro syn. *Gagea pauciflora* Turcz. ex Ledeb.

Isotypus: «Ojok, 1929, legit cl. Basmin. Renutt» (KW).

### *Veratrum* L.

1. *V. oxysepalum* Turcz. 1840, Bull. Soc. Nat. Moscou, 1 : 79; Кузен. 1935, во Фл. СССР, 4: 14; Череп. 1995, Сосуд, раст. Росс. и сопред. госуд.: 601.

Holotypus: «Tigil in Kamczatka. Renutt» (KW).

Примечание. В протологе указано: «Prope Tigil in Kamczatka». В Гербарии LE (как в коллекции типов, так и в гербарии растений сектора Сибири) типовые образцы отсутствуют. Здесь хранится только 2 образца из *locus classicus*, однако они собраны значительно позже даты описания вида: «Тигил, Камчатка, 1848 15 VIII. Дг. Левицкий»; «г. Тигил, 1 VIII 1910».

### Благодарности

Авторы благодарны А. К. Сытину (БИН РАН, С.-Петербург) за помощь в получении протологов некоторых видов.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Борділовський Є. І. Рід Пізноцвіт — *Colchicum* L. /С Флора УРСР. Киев, 1950. Т. 3. С. 74—79.

Каталог типовых образцов сосудистых растений Центральной Азии, хранящихся в Гербарии Ботанического института имени В. Л. Комарова (LE) / Под ред. В. И. Грубова. СПб., 2000. 235 с.

Омельчук-Мякушко Т. Я. Род Лук — *Allium* L. // Флора европейской части СССР. Л., 1979. Т. 4. С. 261—275.

Пвелёв Н. Н. Род Безвременник — *Colchicum* L. // Флора европейской части СССР. Л., 1979. Т. 4. С. 218—220.

### SUMMARY

The list of vascular plants species of *Liliaceae* Juss. s. l. in the KW Herbarium is presented. The following data are provided: the original nomenclatural citation, a category of the type (holotype, lectotype, isotype, neotype) kept.