

ТИПІФІКАЦІЯ ВИДІВ СУДИННИХ РОСЛИН, ОПИСАНИХ З УКРАЇНИ:
РОДИНА FABACEAE LINDL.

таксономія, тип виду, базіонім, голотип, лектотип, ізотип, неотип, Fabaceae, Україна

У статті наведено список видів родини Fabaceae Lindl., описаних на території України. На основі критичного перегляду літературних даних та гербарних матеріалів проведено їх типіфікацію.

Значну кількість нових для науки видів родини Fabaceae флори України описано в процесі інвентаризації флори окремих її регіонів у працях Ф. Біберштейна, В. Бессера, С. Палласа, Х. Стевена та інших натуралістів ще в кінці XVIII та на початку XIX століть. Пізніше до цієї справи долучилися Б. Блоцький, Е. Ліндеман, Й. Пачоський, Г. Ширяев та інші дослідники. Ряд нових таксонів було описано також у процесі критичного дослідження флори України, пов'язаного з виданням «Флори СРСР», «Флори УРСР», «Флори Крима» та дослідженням регіональних флор (А. Борисова, О. Вісюліна, М. Клоков, В. Кречетович, Л. Крицька, М. Котов, С. Юзепчук та інші).

Види родини Fabaceae, описані з України, неодноразово переглядали монографи та автори флористичних зведень, які визнавали їх або розглядали у складі інших таксонів, проте підтвердили видовий статус більшості з них. Але певні таксони досі залишаються критичними.

Даний список підготовлено на основі ревізії родини і включає 112 видів (деякі зараз розглядаються як синоніми).

Для кожного виду вказано базіонім, основну синоніміку, а також номенклатурний тип (цитовання протологу або голотипу, лектотипу чи неотипу) та місце його зберігання. В окремих випадках замість конкретного номенклатурного типу наведено автентичні зразки. Тип подається згідно з оригінальним описом зі збереженням старих назв адміністративних пунктів.

Anthyllis L.

1. *A. Biebersteiniana* Popl., 1931, Сп. раст. Крымск. заповед.: 55, 190; Миняев, Акулова, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 100.

Тип: «Яйла, между Алуштой и Судаком» (LE, лектотип).

2. *A. schiwereckii* (DC.) Błocki, 1912, Oesterr. Bot. Zeitschr. 62: 397, p. p.; Вісюліна, 1954, Фл. УРСР, 6: 420; Миняев, Акулова, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 102. — *A. vulneraria* L. var. *schiwereckii* DC. 1825, Prodr. 2: 170.

Тип: «Schiw.! ex herb. Bess.!, in litt.» (місце знаходження невідоме).

Примітка. Вказані у протолозі автентичні зразки, ймовірно, зберігаються у Львові (LW) — збори Б. Шиверека: «Schiw.!» та Женеві (G) — збори В. Бессера: «ex herb. Bess.!».

3. *A. taurica* Juz., 1941, Фл. СССР, 11: 392, 274; Миняев, Акулова, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 102.

Тип: «in Tauria» (LE, голотип).

Astragalus L.

1. *A. abruptus* Krytzka, 1978, Нов. системат. высш. и низш. раст., 1977: 130; Крицкая, 1987, Определ. высш. раст. Укр.: 197. — *A. pseudotataricus* auct. non Boriss.: Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 73.

Тип: «RSS Ukr., dit. Nikolajewiensis, distr. Novoodessanus, p. Michajlovka, declivis calcarea ad ripam sinistram fl. Nypanis, 19.V.1973, L. Krytzka» (KW, голотип).

2. *A. arnacantha* M. Bieb., 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 205, s. restr.; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 64.

Тип: «in Tauriae meridionalis collibus lapidosis...» (LE, лектотип; MW, ізолектотип).

3. *A. borysthenticus* Klokov, 1946, Ботан. журн. АН УРСР, 3, 1-2: 21; Вісюліна, 1954, Фл. УРСР, 6: 473; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 69.

Тип: «Азово-Сивашский госзаповедник, о-в Бирючий. Песчаноракушняковая степь, 20.VII.1953, Парнасский (N 27)» (KW, неотип).

Примітка. В Гербаріях CWU і KW вказаний у протолозі тип «RSS Ucr., insula maotica Birjuczij. In sabulosis maritimis, 12.VI.1935, leg. T. Cziczka, CWU» відсутній. Ймовірно, він загублений.

4. *A. cinereus* M. Bieb. ex Besser, 1822, Enum. Pl. Vohl.: 29; Вісюліна, Фл. УРСР, 6: 484, pro sup. *A. pallescens* M. Bieb.

Тип: «Pod. australiori» (KW, лектотип).

5. *A. concavus* Boriss., 1951, Ботан. мат.-лы (Ленинград), 14: 218. — *A. reducus* auct. non Pall.: Гончаров, 1946, Фл. СССР, 12: 535; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 69.

Тип: «Мелитопольский округ, Аскания-Нова, на степных участках в ботаническом парке, 30.V.1923, пл., Дзевановский» (LE, голотип).

6. *A. corniculatus* M. Bieb., 1810, Cent. Pl. Rar. Ross. Mer. 1: tab. 45; id. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 492; Вісюліна, 1954, Фл. УРСР, 6: 478; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 73.

Тип: «in campestribus apricis argillosis Bessarabiae versus Hypanis ostia et circa portium Odessanus» (LE).

7. *A. cretophilus* Klokov, 1961, Ботан. мат.-лы (Ленинград), 21: 238; Крицкая, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 197; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 73, pro sup. *A. cornutus* Pall.

Тип: «Ворошиловградская обл., Меловский р-н, Ново-Александровский (64) конный завод, меловые обнажения по р. Евсугу, 10.VIII.1949, М. Котов» (KW, голотип).

8. *A. dolichophyllus* Pall., 1800, Spec. Astrag.: 84, tab. 68; Вісюліна, 1954, Фл. УРСР, 6: 476; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 72.

Тип: «Ubique per deserte Caspia et omnem magnam Tatariam, usque ad Irtn fl. communis ... circa Odessam... in angulo Chersonesi Tauricae, Tarchan dip (Tarchanskoj kut)» (BM?).

9. *A. glaucus* M. Bieb., 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 186; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 76.

Тип: «in Tauria collibus siccis» (LE).

10. *A. hypanicus* Krytzka, 1974, Укр. ботан. журн., 31, 4: 455; Крицкая, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 197. — *A. pallescens* auct. fl. ucr., non M. Bieb.: Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 74.

Тип: «RSS Ucr., dit. Mycolajivensis, distr. Novoodessanus, prope p. Troitzke, in declivibus calcareis ad Hypanim, 15.V.1972, L. Krytzka» (KW, голотип, ізотип).

11. *A. krajinae* Domin, 1931, Acta Bot. Bohem. 10: 48; Вісюліна, 1954, Фл. УРСР, 6: 452; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 57.

Тип: «Rossia subcarpatica orientali-septentrionalis montes Svidovec, locis saxosis et graminosis ad rupes Dragobrat, substrato arenaceo-calicerifero formationis «Flyscha» dictae, altitudine circa 1650—1700 m s.m.» (PRC).

12. *A. novoascanicus* Klokov, 1947, Ботан. журн. АН УРСР, 3, 1-2: 19; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 60; Крицкая, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 194, pro sup. *A. henningii* (Steven) Klokov.

Тип: «RSS Ucr., Ascania-Nova, steppa reservata. 12.V.1926, leg. M. Shalyt» (KW, голотип).

13. *A. odessanus* Besser, 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 30; Клоков, 1953, Ботан. мат.-лы (Ленинград), 15: 153; Вісюліна, 1954, Фл. УРСР, 6: 481, pro sup. *A. cornutus* Pall.; Крицкая, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 197; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 72, pro sup. *A. cornutus* Pall.

Тип: «Prope Odessam legi A. 1816» (KW, лектотип). Примітка. У Гербарії В. Бессера (KW) зберігаються два автентичні зразки виду. Протологу в більшій мірі відповідає

екземпляр, на етикетці якого рукою А. Андржейовського вказано рік збору (1816) та колектор (А.), але без місцезнаходження. На етикетці другого гербарного аркуша той же колектор вказує, що рослина вирошена у ботанічному саду м. Кременця з насіння, зібраного в околицях Одеси.

14. *A. olgianus* Krytzka, 1974, Укр. ботан. журн., 31, 4: 457; Крицкая, 1987, Определ. высш. раст. Укр.: 197; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 74, pro syn. *A. macropus* Bunge.

Тип: «RSS Ukr. dit. Voroschilovgradensis, distr. Milovensis, in reservata steppaco Striletzkiy step dicto, steppa virginea plana. 19.V.1959. S. Smolko et O. Dubovik» (KW, голотип).

15. *A. oxyglottis* Steven ex M. Bieb., 1808, Fl. Taur.-Cauc., 2: 192; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 63.

Тип: «in Tauriae collibus, circa Sudak» (H).

16. *A. ponticus* Pall., 1800, Spec. Astrag.: 14; Вісюліна, 1954, Фл. УРСР, 6: 466; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 65.

Тип: «... in littorali montano Tauriae praesertim in saxosa valle inter Sudak et Kutlak» (BM?).

17. *A. pseudoglaucus* Klokov, 1953, Ботан. мат-лы (Ленинград), 15: 150; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 74.

Тип: «Одеса, район. Правий берег Хаджибеївського лиману між Алтестовим і Холодною Балкою. Схили з виходом вапняку. 4.VI.1951, М. Клоков» (KW, голотип; LE, ізотип).

18. *A. reduncus* Pall., 1800, Spec. Astrag.: 109; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 69.

Тип: «in arenosis circa Zarizyn et ad omnem sarpam fl. in Volgam confluentem, nec non circa Cumam fl. et in descensu montis Karadagh Tauriae versus» (BM ?; LE, ізолектотип).

19. *A. rupifragus* Pall., 1800, Spec. Astrag.: 86; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 71; Борисова, 1960, Фл. Крыма, 2, 2: 188, pro syn. *A. testiculatus* Pall.

Тип: «in maxime rupestribus totis orae meridionalis Tauriae aridissimus saepe in montibus. Maxime vulgaris circa Portium dictum Cembalum, qui est Symbolarum apud antiquos et Balaclava Tatarorum, quod vero similime a Palacio, arce Mithridatis, ortum est nomen» (BM?).

20. *A. setosulus* Gontsch., 1947, Ботан. мат-лы (Ленинград), 10: 33; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 61.

Тип: «Tauria, in monte Demerdshi in viciniis opp. Alushta, 25.VII.1894, fr., leg. Alexeenko» (LE, голотип).

21. *A. similis* Boriss., 1951, Ботан. мат-лы (Ленинград), 14: 216; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 70.

Тип: «Tauria, Planerskoje, 18(5).VI.1907, fr., Vankov» (LE, голотип).

22. *A. striatellus* Pall. ex M. Bieb., 1808, Fl. Taur.-Cauc., 2: 189; Вісюліна, 1954, Фл. УРСР, 6: 465; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 61.

Тип: «in Tauria meridionalis, circa Sudak» (LE).

23. *A. subuliformis* DC., 1802, Astrag.: 134; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 73.

Тип: «in Tauria» (G).

24. *A. suprapilosus* Gontsch., 1946, Ботан. мат-лы (Ленинград), 9: 137; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 71.

Тип: «Tauria. Theodosia, in declivis prope sinum Dvujakognaja» (LE, голотип).

25. *A. tarchankuticus* Boriss., 1951, Ботан. мат-лы (Ленинград), 15: 222; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 76, pro syn. *A. glaucus* M. Bieb.

Тип: «Крым, Тарханкутский п-ов, северо-западный склон балки Кипчак, каменная злаково-полянная степь, 30.V.1946, цв., Дзенс-Литовская» (LE, голотип).

26. *A. tauricus* Pall., 1800, Spec. Astrag.: 48; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 67.

Тип: «in glarcesco-margaceis et cretaceis Tauricae Chersonesi, locis submontanis, arpicis, aridis, praesertim secundum fluvius Salgir et Karassu» (LE).

27. *A. ucrainicus* M. Pop. et Klokov, 1946, Ботан. журн. АН УРСР, 3, 1-2: 22; Попов, 1947, Ботан. мат.-лы (Ленинград), 10, 1-12: 13, повторний опис; Вісюліна, 1954, Фл. УРСР, 6: 479; Васильєва, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 73.

Тип: «Ukrainskaja SSR. Prov. Dnepropetrovsk, in ditone Kolarov, prope pag. Jurevskoje, 15.VIII.1933, fr., leg. Klokov» (LE, голотип).

Примітка. Вид вперше наведений у статті М. Клокова у 1946 р., (ц. м.), де за тип обрано інший зразок: «RSS Ukr., prov. Voroschilovgrad., prope pag. Verchnje in distr. Artemovsk. In declivio 16.V.1927, leg. I. Zoz». Він зберігався у Гербарії *CWU* і зараз загублений. Тому за голотип обрано зразок, який М. Попов цитує при повторному описі виду.

28. *A. utriger* Pall., 1800, Spec. Astrag.: 75; Васильєва, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 59. Тип: «in summis rupibus montis Golaja Tauriae, valli Soldajensi» (BM?).

Примітка. В літературі тривалий час наводяться ще два види роду *Astragalus* — *A. dealbatus* Pall. та *A. virgatus* Pall. назви яких, як з'ясувалось, є невалідними.

A. dealbatus Pall., 1800, Spec. Astrag.: 26, nom. illeg.; Дубовик, 1986, Хорол. фл. Укр.: 130, р. р.; Крицкая, 1987, Определ. высш. раст. Укр.: 196, pro syn. *A. tarshanicus* Boriss.; Васильєва, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 76, pro syn. *A. glaucus* M. Bieb.

Тип: описаний з Криму (цит. за «Флора СССР», 1946, т. 12) (LE).

A. virgatus Pall., 1800, Spec. Astrag.: 20; Вісюліна, 1954, Фл. УРСР, 6: 483. — *A. varius* S.G. Gmel. 1770, Reise Russl. 1: 116; Васильєва, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 74.

Тип: «Южная Россия» (цит. за «Флора СССР», 1946, т. 12); описаний з України (Дніпропетровськ) і Росії (Арзагар): А. Ситін, 1999, Ботан. журн., 84, N 11 (у друці) (BM?).

Caragana Lam.

1. *C. mollis* (M. Bieb.) Besser, 1822, Enum. Pl. Volh.: 29; Вісюліна, 1954, Фл. УРСР, 6: 445, sine auct. comb.; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 43. — *Robinia mollis* M. Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 477.

Тип: «in promontorio Caucasi septentrionali passim, frequentior in Bessarabia, inter Elisabethgrad et Odessam, nec non in Polonia australiore» (LE).

2. *C. scythica* (Kom.) Rojark., 1941, Фл. СССР, 11: 396, 341; Вісюліна, 1954, Фл. УРСР, 6: 445; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 45. — *C. grandiflora* DC. var. *scythica* Kom. 1909, Тр. Петерб. ботан. сада, 29, 2: 220, non *C. grandiflora* DC.

Тип: «На солнечном скате Сиваша, Перекоп, граница уезда, 17.V.1901, О. Егорова» (LE, лектотип).

Chamaecytisus Link

1. *Ch. pineticola* Ivchenko, 1992, Укр. ботан. журн., 49, 2: 86. — *Ch. zingeri* (Nenukow ex Litv.) Klask., 1958, Preslia, 30, 2: 214. — *Cytisus zingeri* (Nenukow ex Litv.) Krecz. 1940, Ботан. журн., 25, 3: 260, р. min. p. — *C. ruthenicus* Fisch. ex Wolf. var. *zingeri* Nenukow ex Litv. 1917, в Маевский, Фл. Ср. Росс., изд. 5: 133.

Тип: «RSS Ucr., in adjacentibus Kioviae, prope Irpenj margines pineti, 25.V.1976, I. Ivchenko» (KW, голотип).

Cytisus L.

1. *C. albus* Hacq., 1790, Neue Reise Dac. Sarmat. Karp. 1: 49; Вісюліна, 1954, Фл. УРСР, 6: 343; Rothm. 1944, Feddes Repert., 53, 2: 144, pro syn. *Chamaecytisus albus* (Hacq.) Rothm.; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 225, pro syn. *Chamaecytisus albus* (Hacq.) Rothm.

Тип: «in der fruchtbaren Ebenen von Podolien, bis zu dem kleinen Markt Zalesczok» (LJM).

2. *C. blockianus* Pawł., 1924, in Szafer, Kulczyński et Pawłowski, Rosl. Polskie: 389; Klask. 1958, Preslia, 30, 2: 214, pro syn. *Chamaecytisus blockianus* (Pawł.) Klask.; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 224, pro syn. *Chamaecytisus blockianus* (Pawł.) Klask. — *Cytisus blockii* Krecz., 1940, Ботан. журн., 25, 3: 256; Кречетович, 1941, Фл. СССР, 11: 86, descr. ross.

Тип: «... на Pok. Pod. Op. Woł. pd.» (на Покутті, Поділлі, Опіллі, півдні Волині) (KRAM).

3. *C. borysthenticus* Gruner, 1869, Bull. Soc. Nat. Mosc., 41, 2: 37 («Cytisi sp. nova?») et 41, 4: 446, nomen; Klásk. 1958, Preslia, 30, 2: 214, pro syn. *Chamaecytisus borysthenticus* (Gruner) Klásk.; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 222, pro syn. *Chamaecytisus borysthenticus* (Gruner) Klásk.

Тип: «in collibus arenosis reg. demissae ad Borysthenem satis frequens» (MW).

4. *C. bucoviensis* Simonk., 1888, Math. es Termesz. Közlem., 22: 361 «bucovinensis». — *C. albus* Hacq. var. *bucoviensis* (Simonk.) Wissjul. 1954, Фл. УРСР, 6: 343.

Тип: «*Cytisus capitatus* Scop. Terem a Sereth menten. 1836, Herbich (exs.)» (BP, голотип).

5. *C. x czerniaevii* Krecz., 1940, Ботан. журн. СССР, 25, 3: 261 «czerniaevii» (*C. lindemannii* Krecz. x *ruthenicus* Fisch. ex Wot.); Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 222, pro syn. *Chamaecytisus x czerniaevii* (V. Krecz.) Tzvel.

Тип: «ex Ucraina charcoviensis (e Charkovia et ditione opp. Tschugujev» (LE, голотип).

6. *C. graniticus* Rehmman, 1872, Verh. Naturf. Ver. Brunn, 10: 59; Rothm. 1944, Feddes Repert., 53, 2: 144, pro syn. *Chamaecytisus graniticus* (Rehmann) Rothm.; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 225, pro syn. *Chamaecytisus graniticus* (Rehmann) Rothm.

Тип: «Auf Granitfelsen an Ufern des Flusses Hromokleja hinter dem Stadtchen Nowosiejack in grosser Menge» (KRAM).

7. *C. kernerii* Blocki, 1895, Allg. Bot. Zeitschr., 1: 137, non Schultz, Kanitz et Knapp, 1866.

Тип: «Fl. v. Galizien: Illeszczawa pr. Tarnopol. 5 et 7 '90, leg. Błocki.» (LW?, лектотип; LE, ізолектотип).

8. *C. kreczetowiczii* Wissjul., 1954, Фл. УРСР, 6: 586, 336, рис. 105; Holub, 1976, Folia Geobot. et Phytotax., 11, 1: 83, pro syn. *Chamaecytisus kreczetowiczii* (Wissjul.) Holub.; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 222, pro syn. *Chamaecytisus kreczetowiczii* (Wissjul.) Holub.

Тип: «Надзів'я. Маріупільщина, Харцизька балка, що впадає в р. Гр. Сланчик, на відслоненнях сарматського вапняку. 23.V.1926, Ю. Клеопов» (sub. nom. *Cytisus ratisbonensis* Schaeffer, nec *Cytisus ruthenicus* Fisch. ex Wot.) (KW, голотип, ізотип).

9. *C. leiocarpus* A. Kern., 1863, Oesterr. Bot. Zeitschr., 13: 90. Rothm. 1944, Feddes Repert., 53, 2: 144, pro syn. *Chamaecytisus leiocarpus* (A. Kern.) Rothm.; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 223, pro syn. *Chamaecytisus leiocarpus* (A. Kern.) Rothm.

Тип: «Habitat in locis petrosis regionis fagi Carpatorum orientaliu solum calcareo. In tractu fluvii Koros in montibus infra Petrosam et Rezbanyam, imprimis in cacumine montis Tartarogae et in parte orientale montis Petra ...» (WU).

10. *C. lindemannii* Krecz., 1940, Ботан. журн., 25: 259; Klásk. 1958, Preslia, 30, 2: 214, pro syn. *Chamaecytisus lindemannii* (Krecz.) Klásk.; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 222, pro syn. *Chamaecytisus lindemannii* (Krecz.) Klásk.

Тип: «Elisabethgrad, 6 Maj 1873, Ed. Lindemann (sub. nom. *C. elongatus* Kit.)» (LE, голотип, ізотип).

11. *C. pasczkii* Krecz., 1940, Ботан. журн., 25, 3: 261; Klásk. 1958, Preslia, 30, 2: 214, pro syn. *Chamaecytisus pasczkii* (Krecz.) Klásk.; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 223, pro syn. *Chamaecytisus pasczkii* (Krecz.) Klásk.

Тип: «Восточная Галиция. Тарн. губ. Лес у дер. Киданцы в 2-х верстах от ст. Максимовка, 26.IV.1916, А. Михельсон» (LE, голотип).

12. *C. podolicus* Błocki, 1895, Allg. Bot. Zeitschr., 1: 137; Klásk. 1958, Preslia, 30, 2: 214, pro syn. *Chamaecytisus podolicus* (Błocki) Klásk.; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 224, pro syn. *Chamaecytisus podolicus* (Błocki) Klásk.

Тип: «Probabin pr. Horodenka (Galiciae orient.-australis) — in collibus gipsaceis, 22.V.1891, В. Блоскі (N 126608)» (LW, лектотип; KRAM, ізолектотип).

Примітка. В Гербарії KRAM зберігається зразок: «Probabin p. Horodenka (Galiciae orientalis) in collibus et rupibus gipsaceis io frequency 1889, В. Блоскі з «notae criticae»: Isotypus? First sheet: possible type of *C. podolicus* Błocki. det. Cristofolini».

13. *C. polytrichus* M. Bieb., 1819, Fl. Taur.-Cauc., 3: 477; Rothm. 1944, Feddes Repert., 53, 2: 144, pro syn. *Chamaecytisus polytrichus* (M. Bieb.) Rothm.; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 224, pro syn. *Chamaecytisus polytrichus* (M. Bieb.) Rothm.

Тип: «Taur. merid.» (LE, лектотип).

Примітка. На гербарному аркуші, що зберігається у С.-Петербурзі (LE), знаходиться potae criticae: «*Cytisus polytrichus* Bieb. Typus vel isotypus ! 1974. Teste N. Tzvelev».

14. *C. ruthenicus* Fisch. ex Wol., 1886, Oesterr. Bot. Zeitschr., 36: 151; Fisch. 1824, Index Pl. Herb. Petropol.: 25, nom. nud.; Klásk. 1958, Preslia, 30, 2: 214, pro syn. *Chamaecytisus ruthenicus* (Fisch. ex Wol.) Klásk.; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 220, pro syn. *Chamaecytisus ruthenicus* (Fisch. ex Wol.) Klásk.

Тип: «Patria Galicia»; «Janower Wald bei Lemberg» (LW ?).

15. *C. scrobiszewskii* Pacz., 1924, Acta Soc. Bot. Polon., 2, 1: 65; Klásk. 1958, Preslia, 30, 2: 214, pro syn. *Chamaecytisus scrobiszewskii* (Pacz.) Klásk.; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 225, pro syn. *Chamaecytisus scrobiszewskii* (Pacz.) Klásk.

Тип: «По известняках и глин. склонах берега реки Тягинки. 6.VI.1910. J. Paczowski» (Гербарій Херсонського краєзнавчого музею (KHEM, лектотип; LE, MSUD, ізолектотипи).

16. *C. variabilis* Błocki, 1884, Oesterr. Bot. Zeitschr., 34: 427.

Тип: «*C. variabilis* mihi (*C. leucanthus*...) Bilcze prope Borszczow (Galiciae orient-austr.), loco Horodyszczce, 1884, Kofbron, Błocki (N 70957)» (LW, лектотип).

Примітка. В Гербарії LE зберігається не ізотип, як стверджує А. Пояркова, а один із автентичних зразків.

17. *C. wulfii* Krecz., 1940, Ботан. журн., 25, 3: 262; Klásk. 1958, Preslia, 30, 2: 214, pro syn. *Chamaecytisus wulfii* (Krecz.) Klásk.; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 223, pro syn. *Chamaecytisus wulfii* (Krecz.) Klásk.

Тип: «Tauria, supra Jalta, in pineto supra Utschan-su, 7/16.V.1901, W. Transschel legit» (LE, голотип).

Dorycnium Mill.

1. *D. intermedium* Ledeb., 1820, Index Sem. Horti Dorpat.: 14; Миняев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 118; Шеляг-Сосонко, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 191, pro syn. *D. herbaceum* Vill.

Тип: «...lapidosus cretaceis et shistosis Tauricae» (LE).

Galega L.

1. *Galega patula* Steven, 1856, Bull. Soc. Nat. Mosc., 29, 3: 140; Горшкова, 1945, Фл. СССР, 11: 303, pro syn. *Galega officinalis* L. 1753.

Тип: «In montosis ad rivulos: Tofschanbassar, Nikita» (H).

Genista L.

1. *G. albida* Willd., 1800, Sp. Pl., 3, 2: 942; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 234. Тип: «in Tauria» (B).

2. *G. borysthena* Kotov, 1940, Ботан. журн. АН УРСР, 1, 2: 275; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 230, pro syn. *G. sibirica* L.

Тип: «Херсонская обл., Цюрупинский р-н, Нижнеднепровские пески, с. Буркуты, песчаные кучугуры. 11.VI.1948, М. Котов, Е. Карнаух» (KW, неотип).

Примітка. Вказаний М. Котовим у протоколі тип «Миколаївська обл., Буркутські плавні, 23.VII.1923, зібр. Дзевановський», що зберігався в Гербарії KW, загублений.

3. *G. depressa* M. Bieb., 1819, Fl. Taur.-Cauc., 3: 460; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 231.

Тип: «in Tauriae maxime meridionalis montosis» (LE).

4. *G. donetzica* Kotov, 1940, Ботан. журн. АН УРСР, 1, 2: 276; Вісюліна, 1954, Фл. УРСР, 6: 325, pro syn. *G. tinctoria* var. *donetzica* (Kotov) Wissjul.; Цвелев, 1987, Фл. европ. части, 6: 230, pro syn. *G. tinctoria* L.

Тип: «Артемівська (Бахмутська округа), окол. с. Серебрянка, на глинясто-крей-дних відслоненнях, 15.VIII.1928, Р. Oksijuk» (KW, голотип).

5. *G. godetii* Spach, 1845, Ann. Sci. Nat. (Paris), ser. 3, 3: 118; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 233.

Тип: «In Tauria legit cl. Godet» (P).

6. *G. juzepczukii* Tzvelev, 1980, Нов. системат. высш. раст., 17: 166; Дубовик, 1990, Нов. системат. высш. раст., 27: 83.

Тип: «Крым, на лесистом склоне к р. Зуя выше сел. Кипчак, 25.V.1949, п 1451, С. Юзепчук и Л. Куприянова» (LE, голотип).

7. *G. marginata* Besser ex Andrż., 1860, в Андриевский, Исчисл. раст. Подол. губ.: 29; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 230, про syn. *G. tinctoria* L.

Тип: «Pod. austral. Besser» (KW, лектотип).

8. *G. pontica* (Zelen.) Juz., 1951, Ботан. мат-лы (Ленинград), 14: 14. — *G. albida* auct. p. p., non Willd.: Шишкин, 1945, Фл. СССР, 11: 57. — *G. albida* Willd. var. *pontica* Zelen., 1906, Мат-лы для фл. Крыма: 236. — Дубовик, 1990, Нов. системат. высш. раст., 27: 83, pro syn. *G. millii* Heldr. ex Boiss.

Тип: «Tauria meridionalis, pagus Nikita, 1869, fl. Basiner» (LE, лектотип).

9. *G. scythica* Pacz., 1889, Зап. Киев. о-ва естествоиспытат., 10, 2: 424, tabl. 7, fig. 8-9, s. restr.; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР., 6: 233.

Тип: «gub. Cherson, Mielowoje et Osokorowka Borysthenem, apr. 1888, J. Paczoski» (KW, лектотип).

Примітка. За лектотип виду М. Цвельов (ц.м.) обрав екземпляр із с. Качкарівки, але оскільки цей зразок змонтовано разом з іншими, які відносяться до *Genista millii* (на одному гербарному аркуші), на що М. Цвельов не звернув увагу, за лектотип прийнято процитований вище гербарний екземпляр.

10. *G. taurica* Dubovik, 1991, Нов. системат. высш. раст., 28: 96. — *G. depressa* M. Bieb. var. *cretacea* Krjukova, 1969, Ареалы раст. фл. СССР, 2: 235.

Тип: «Крым, Бахчисарайский р-н, на крутом меловом склоне южной экспозиции в окр. ст. Сирень, 30.VI.1962, И. Крюкова» (LE, голотип; KW, изотип).

11. *G. tetragona* Besser, 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 73; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 231.

Тип: «ad Jaorlik et Tугам» (KW, лектотип).

12. *G. verae* Juz., 1951, Ботан. мат-лы (Ленинград), 14: 13; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 233; Н. Чернова, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 2: 112, про syn. *G. scythica* Pacz.

Тип: «Гора Аю-Даг, скалистое место в дубово-грабниновом лесу, 11.VII.1948, отцв., пл., Раст. Крыма, N 645. С. Юзепчук и В. Голубкова» (LE, голотип).

Hedysarum L.

1. *H. candidum* M. Bieb., 1808, Fl. Taur.-Cauc., 2: 176; Васильева, Фл. европ. части СССР, 6: 93.

Тип: «in collibus cretaceis Tauriae, circa Karassubasar et Sympheropolin» (LE).

2. *H. pallasii* Willd., 1802, Sp. Pl., 3: 1214. — *Onobrychis pallasii* (Willd.) M. Bieb. 1810, Cent. Pl., 1: tab. 35; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 98. — *Xanthobrychis pallasii* (Willd.) Galushko, 1979, Фл. Сев. Кавк. и вopr. ее истории, 3: 54.

Тип: «in Tauria» (B).

3. *H. tauricum* Pall. ex Willd., 1802, Sp. Pl., 3: 1208; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 90.

Тип: «in Tauriae montibus calcareis» (B).

4. *H. ucraïnicum* Kaschm., 1905, Изв. Петерб. ботан. сада, 5: 59; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 90.

Тип: «... меловое обнажение около Гаврилова хутора близ р. Айдар, немного ниже слободы Шаровой, почти на границе с Воронежской губернией» (LE).

Lathyrus L.

1. *L. rotundifolius* Willd., 1802, Sp. Pl., 3, 2: 1088; Чефранова, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 153.

Тип: «in Tauria» (B).

Lens L.

1. *L. nigricans* (M. Bieb.) Webb. et Berth., 1842, Hist. Nat. II. Canar., 3, 2: 97; Чеданова, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 172. — *Ervum nigricans* M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc., 2: 164.

Тип: «In Tauriae meridionalis collibus et ad sylvarum margines reperitur» (LE).

Lotus L.

1. *L. ambiguus* Besser ex Spreng., 1826, Syst. Veg., 3: 282; Клоков, 1953, Ботан. мат-лы (Ленинград), 15: 146; Миняев, Улле, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 112.

Тип: «Cremenetz» (KW, лектотип).

2. *L. elisabethae* Opperman ex Wissjul., 1954, Фл. УРСР, 6: 588, 429, рис. 81; Миняев, Улле, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 114.

Тип: «*Lotus corniculatus* L. subsp. *tenuifolius* L. Distr. Mariupol. Білосарайська коса. Вогкий гумусований пісок по краю піскового гребня. 3.VII.1929. С. Постригань» (KW, неотип).

Примітка. Вказаний О. Вісколіною у протолозі тип «RSS Ucr., ditio Staliniensis, loco Belossaraiskaja Kossa dicto, 15.VII.1933, leg. S. Postryganj», що зберігався в Гербарії KW, загублений. Зразок, обраний за неотип, супроводжується «nota critica» П. Опперманна «*Lotus Elisabethae* Oppermann species nova, 1931 г.».

3. *L. olgae* Klokov, 1961, Ботан. мат-лы (Ленинград), 21: 235; Миняев, Улле, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 113.

Тип: «Луганская обл., Меловской р-н, заповедник «Стрелцкая степь». Ложбинка. 13.VIII.1958, О. Дубовик» (LE, голотип; KW, ізотип).

4. *L. praetermissus* Kurpian., 1937, Ботан. мат-лы (Ленинград), 7: 37; Миняев, Улле, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 108.

Тип: «Prope Starobelsk in arenis, 1.VII.1904, Schirajewsky» (LE, голотип).

5. *L. tauricus* Juz., 1951, Ботан. мат-лы (Ленинград), 14: 14, рис. 1; Миняев, Улле, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 112.

Тип: «Подъем на гору Роман-кош от Алабача (Бабуган-яйла), 20.VII.1948, цв., Раст. Крыма, N 730, С. Юзепчук и В. Голубкова» (LE, голотип).

6. *L. ucrainicus* Klokov, 1961, Ботан. мат-лы (Ленинград), 21: 232; Миняев, Улле, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 114.

Тип: «*Lotus corniculatus* L. Prov. Kiev, in pratis siccis pr. urbem Umanj, VI.1899, E. Koliassinsky» (LE, голотип; KW, ізотип).

Medicago L.

1. *M. cretacea* M. Bieb., 1808, Fl. Taur.-Cauc., 2: 223. — *Trigonella cretacea* (M. Bieb.) Taliev, 1905, Раст. мелов. обнаж. Юж. Рос. 2: 69. — *Melissitus cretaceus* (M. Bieb.) Latsch. 1958, Тр. Тбил. ботан. ин-та, 19: 13. — *Crimea cretacea* (M. Bieb.) Vassilcz. 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 187.

Тип: «in Tauriae abruptis sterilissimis cretaceis circa Karasubasar» (LE).

2. *M. erecta* Kotov, 1940, Ботан. журн. АН УРСР, 1, 2: 276, non Winterl. — *M. kotovii* Wissjul. 1954, Фл. УРСР, 6: 367, пом. пов.; Крицкая, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 186; Васильченко, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 191, pro syn. *M. falcata* L. subsp. *romanica* (Prod.) Schwarz et Klinkovski.

Тип: «Остров Бирючий в Азовском море, на ракушняке песчаном, почва песчаная. 8.VII.1927. М. Котов» (KW, лектотип).

3. *M. procumbens* Besser, 1809, Prim. Fl. Galic., 2: 127; Крицкая, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 185; Васильченко, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 190, pro syn. *M. falcata* L.

Тип: «*M. falcata* L., *M. procumbens* (ex herb. W. Bess.)» (KW, неотип).

Примітка. Протолог виду «... Leopoli et Cracoviae» не відповідає гербарним зразкам, які зберігаються в гербарії В. Бессера (KW). Тут знаходяться чотири гербарні аркуші, на етикетках яких рукою В. Бессера написано «*M. procumbens*». На трьох не зазначено конкретного місцезростання виду, хоча на одному з цих трьох є нотатка автора «cult.», а на четвертому іншим колектором вказано «Curogia». За неотип обрано екземпляр, де невідомим колектором чорнилом написано «*M. falcata* L.», а В. Бессером, олівцем, — «*M. procumbens*».

4. *M. rupestris* M. Bieb., 1808, Fl. Taur.-Cauc., 2: 225; Васильченко, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 193.

Тип: «in rupestribus calcareis Tauriae, circa Karassubasar et Sympheropolin» (LE).

5. *M. saxatilis* M. Bieb., 1808, Fl. Taur.-Cauc., 2: 225; Васильченко, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 191.

Тип: «in Tauriae saxosis» (LE).

6. *M. tenderiensis* Opperman ex Klokov, 1948, Укр. ботан. журн., 5, 2: 45; Крицкая, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 185; Васильченко, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 112, pro syn. *M. falcata* L. subsp. *romanica* (Prod.) Schwarz et Klinkovski.

Тип: «RSS Ukr., insula pontica Dzharylgacz. Steppa sabulosa, 5.IX.1947, leg. E. Pobjedimova» (LE, голотип; KW, паратипи).

Melilotus Mill.

1. *M. pallidus* Besser, 1823, Ind. Sem. Hort. Cremen.: ?; Ser. 1825, in DC. Prodr., 2: 188; Вісюліна, 1954, Фл. УРСР, 6: 376, pro syn. *M. officinalis* L.

Тип: «Pod. Littora» (KW, лектотип).

2. *M. procumbens* Besser, 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 30; Вісюліна, 1954, Фл. УРСР, 6: 358, pro syn. *Trigonella procumbens* (Besser) Rchb. — *T. caerulea* (L.) Ser. subsp. *procumbens* (Besser) Vassilcz. 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 186.

Тип: «in Podolia austr. Bessarabia» (KW, лектотип).

3. *M. tauricus* (M. Bieb.) Ser., 1825, in DC. Prodr., 2: 188; Бобров, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 181. — *Trifolium* (= *Melilotus*) *tauricum* M. Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc., 3: 506.

Тип: «in Tauriae meridionalis» (LE).

Oxytropis DC.

1. *O. pallasii* Pers., 1807, Syn. Pl. 2: 334; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 98.

Тип: «in Tauria» (місцезнаходження невідоме).

Onobrychis Mill.

1. *O. borysthena* (Sirj.) Klokov, 1946, Ботан. журн. АН УРСР, 3, 1-2: 19; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 95. — *O. arenaria* (Kit.) DC. f. *borysthena* Sirj. 1925, Publ. Fac. Sci. Univ. (Brno), 56: 171.

Тип: «RSS Ucr., prov. Nikolajev, prope opp. Golaja Pristanj. In sabulosis ripae sinistrae Borysthenis, 16.VIII.1934. fl. fr. Leg. G. Prokudin» (LE, ізотип).

Примітка. Цитований за протоологом типовий зразок, який зберігався в Гербарії СХУ, загублений. Про наявність ізотипу в Гербарії LE вказується у «Флоре СССР» (1948, 11: 335).

2. *O. gracilis* Besser, 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 74; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 95.

Тип: «in Podolia australis» (LE, лектотип; KW, ізолектотип).

Примітка. В гербарії В. Бессера (KW) у паці зі зразками *O. gracilis* є нотатка О. Дубовик: «... часть автентичного материала вида отослана в Ленинград». Серед матеріалу, який залишився в Києві, лише один екземпляр належить до автентичного (стикетка написана рукою В. Бессера, але без вказівки місцезнаходження), який і обрано за ізолектотип.

3. *O. jailae* Czernova, 1953, Тр. Крым. фил. АН СССР, 8, ботан.: 151; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 96.

Тип: «Бабуган-яйла. Северный склон, подъем на Роман-Кош. 21.06.1948 г. Н.М. Чернова» (YALT, голотип).

4. *O. inermis* Steven, 1856, Bull. Soc. Nat. Moscou, 29, 3: 165; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 96.

Тип: «circa Kertsch ad Bosphorum ... in Caucaso circa Pjatigorsk et in campis elatis ad Nuranim (Kuban)» (H).

5. *O. miniata* Steven, 1856, Bull. Soc. Nat. Moscou, 29, 3: 166; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 96.

Тип: «in montibus ca. Kischlan et in valle Sudak» (H).

6. *O. paczoskiana* Krytzka, 1974, Укр. ботан. журн., 31, 5: 641; Крицкая, 1987, Определ. высш. раст. Укр.: 200; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 95, pro syn. *O. borysthénica* (Sirj.) Klokov. — *O. gracilis* Besser var. *longeaculeata* Pacz. 1889, Зап. Киевск. о-ва естествоиспытат., 10, 2: 426, табл. 5, фиг. 6. — *O. longeaculeata* (Pacz.) Wissjul. 1954, Фл. УРСР, 6: 506, non Pau, 1916.

Тип: «In viciniis urb. Mykolajiv, in arenis silvulae Lisky dictae, 11.VI.1904, A. Janata» (KW, неотип).

7. *O. tesquicola* Krytzka, 1976, Нов. системат. высш. и низш. раст., 1975: 126; Крицкая, 1987, Определ. высш. раст. Укр.: 200; Васильева, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 95, pro syn. *O. arenaria* (Kit.) DC.

Тип: «RSS Ucr., dit. Chersonensis, distr. Berislavensis, praedium defensium venaticum Gavrilovskoje dictum, in declivibus calcareis, 13.VII.1974, L. Krytzka» (KW, голотип).

Orobus L.

1. *O. aureus* Steven, 1836, Index Sem. Horti Petropol., 3: 42. — *Lathyrus aureus* (Steven) Brandza, 1883, Prodr. Pl. Roman., 2: 546; Чефранова, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 157.

Тип: «in Tauria» (H).

2. *O. digitatus* M. Bieb., 1808, Fl. Taur.-Cauc., 2: 153. — *Lathyrus digitatus* (M. Bieb.) Fiori, in Fiori et Paol. 1900, Fl. Ital., 2: 105; Чефранова, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 167.

Тип: «in Tauriae montibus sylvaticis» (LE).

3. *O. pallescens* M. Bieb., 1808, Fl. Taur.-Cauc., 2: 153. — *Lathyrus pallescens* (M. Bieb.) C. Koch, 1841, Linnaea, 15: 729; Чефранова, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 167.

Тип: «in Tauriae campis apricis» (LE).

Trifolium L.

1. *T. ambiguum* M. Bieb., 1808, Fl. Taur.-Cauc., 2: 208; id. 1819, 3: 507; Бобров, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 205.

Тип: «in Tauriae et Caucasi pratis» (LE).

2. *T. borysthénicum* Gruner, 1869, Bull. Soc. Nat. Moscou, 41, 2: 140; Бобров, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 204.

Тип: «окр. д. Веселой в долине р. Конской, к югу от Запорожья» (LE).

3. *T. leucanthum* M. Bieb., 1808, Fl. Taur.-Cauc., 2: 214; id. 1819, 3: 510; Бобров, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 201.

Тип: «in Tauriae meridionalis collibus siccis» (LE).

4. *T. ucrainicum* Opperman ex Wissjul., 1954, Фл. УРСР, 6: 588, 417.

Тип: «УРСР, Ізюмщина, Червоний Оскіл, Великі Луки, луг, 15.VI.1927. М. Клоков» (KW, голотип, ізотип).

Примітка. За Ю. Росковим, *T. ucrainicum* належить до *T. pratense* L. s. l., про що свідчить «Notae criticae», написана ним до одного з автентичних зразків виду, які знаходяться в гербарії KW. Це стало причиною того, що С. Черепанов (1995) відніс *Trifolium ucrainicum* в синоніми до *T. pratense*. В інших монографічних обробках вид не згадується.

Trigonella L.

1. *T. gladiata* Steven ex M. Bieb., 1808, Fl. Taur.-Cauc., 2: 222; Васильченко, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 186.

Тип: «Crescit in Tauriae campis et collibus apricis ad Bosphorum» (LE).

Vicia L.

1. *V. biebersteinii* Besser ex M. Bieb., 1819, Fl. Taur.-Cauc., 3: 472; Федорончук, 1996, Укр. ботан. журн., 53, 5: 593; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 144, pro syn. *V. grandiflora* Scop. subsp. *biebersteinii* (Besser ex M. Bieb.) Dostál.

Тип: «In Podolia ..., in inferioribus fluvii Tanais regionibus ... etiam occurrit» (LE).

2. *V. heracleotica* Juz., 1951, Ботан. мат.-лы (Ленинград), 14: 16; Федорончук, 1996, Укр. ботан. журн., 53, 5: 589. — *V. dalmatica* auct. fl. taur., non A. Kerner; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 136.

Тип: «Мыс Мартьян в можжевеловом лесу, 27.V.1949, цв., Раст. Крыма, N 1487, С. Юзепчук и Л. Куприянова» (LE, голотип).

3. *V. incisa* M. Bieb., 1819, Fl. Taur.-Cauc., 3: 471; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 144.

Тип: «In Tauria maxime meridionali» (LE).

4. *V. lineata* M. Bieb., 1819, Fl. Taur.-Cauc., 3: 473; Б. Федч. 1948, Фл. СССР, 13: 470, pro syn. *V. pannonica* Crantz; Н. Чернова, 1948, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 2: 244, pro syn. *V. pannonica* Crantz var. *uniflora* Boiss.; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 143, pro syn. *V. lutea* L. var. *hirta* Loisel.

Тип: «In Tauria maxime meridionali, circa Nikitam» (LE).

5. *V. loiseleurii* (M. Bieb.) Litv., 1932, Сп. раст. Герб. Фл. СССР, 9: 47; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 137. — *Eryum loiseleurii* M. Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc., 3: 475. — *V. meyeri* Boiss. 1872, Fl. Or., 2: 133. — *V. litvinovii* Boriss. 1960, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 2: 230, nom. illeg. — *V. pubescens* auct. fl. taur., non Link.

Тип: «Cum praecedente in Tauria legi et hucusque confusum habui» (LE).

6. *V. megalosperma* M. Bieb., 1808, Fl. Taur.-Cauc., 2: 161; Н. Чернова, 1948, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 2: 243, in adnot. ad *V. peregrina* L.

Тип: «In Tauriae et Iberiae aruis» (LE).

7. *V. pilosa* M. Bieb., 1808, Fl. Taur.-Cauc., 2: 161; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 145.

Тип: «In Tauriae collibus saxosis, circa fontes riui Salgir et circa Sudak» (LE).

8. *V. striata* M. Bieb., 1808, Fl. Taur.-Cauc., 2: 162; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 142; Н. Чернова, 1960, в Е. Вульф, Фл. Крыма, 2, 2: 244, pro syn. *V. pannonica* Crantz var. *purpurascens* (DC.) Ser.

Тип: «In Tauria meridionali» (LE).

9. *V. tenuissima* (M. Bieb.) Schinz et Thell., 1913, Vierteljahr. Naturf. Ges. Zurich, 58: 70; Цвелев, 1987, Фл. европ. части СССР, 6: 138. — *Eryum tenuissima* M. Bieb. 1798, Tabl. Prov. Casp.: 116. — *Vicia gracilis* auct. fl. taur. non Banks et Soland. — *V. laxiflora* auct. fl. taur. non Brot.

Тип: «Haud infrequens in graminosis» (LE).

Примітка. Вид, ймовірно, описаний з Криму, але без вказівки на конкретне місцезнаходження.

Подяка. Автори широко дячні канд. біол. наук М. Загальському (Львівський Національний університет ім. І. Франка), Р. Кішу (Ужгородський державний університет), канд. біол. наук А. Ситіну (Ботанічний інститут ім. В.І. Комарова РАН, м. С.-Петербург), д-ру Д. Ковачу (Угорський Національний Природничий музей, м. Будапешт) за допомогу в отриманні відомостей про протологи деяких видів.

Рекомендує до друку
Б.В. Заверуха

Надійшла 14.04.98

Л.И. Крицкая, С.Л. Мосьякин, В.В. Новосад, Н.М. Федорончук, О.Н. Царенко, М.В. Шевера

ТИПИФИКАЦИЯ ВИДОВ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ, ОПИСАННЫХ
С УКРАИНЫ: СЕМЕЙСТВО FABACEAE LINDL.

Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, г. Киев

Приведен список видов семейства Fabaceae Lindl., описанных с территории Украины. Для каждого вида указаны основная синонимика, номенклатурный тип (по протологу или голотип, лектотип, изотип, неотип) и место его хранения.

L.I. Krytska, S.L. Mosyakin, V.V. Novosad, M.M. Fedoronchuk, O.M. Tsarenko, M.V. Shevera

TYPIFICATION OF SPECIES OF VASCULAR PLANTS DESCRIBED FROM UKRAINE: FAMILIE FABACEAE LINDL.

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The list of species of vascular plants of the Fabaceae Lindl. described from Ukraine. The following data are provided: basionym; original nomenclatural citation; according protology or holotype, lectotype, isotype, neotype; herbarium (-a) at which the specimen(s) is/are deposited.