

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО НАН УКРАЇНИ**

**АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
БОТАНІКИ ТА ЕКОЛОГІЇ**

**Матеріали міжнародної конференції
молодих учених-ботаніків**

**17-20 вересня 2007 року
Київ**

УДК 58
ББК Е52

Під загальною редакцією к.б.н. О.А. Петльованого

Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали міжнародної конференції молодих учених-ботаніків (17-20 вересня 2007 р., м. Київ). – Київ: Фітосоціоцентр, 2007. – 242 с.

За фінансової підтримки НАН України та АКБ "СітіБанк"

ISBN 966-306-064-2

© Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, 2007

ПОШИРЕННЯ ВИДІВ РОДУ *VINCA L.* У ПОЛТАВСЬКОМУ РАЙОНІ ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ДАВИДОВ Д.А., ГОМЛЯ Л.М.

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, кафедра ботаніки
вул. Остроградського, 2, м. Полтава-36000, Україна

На Полтавщині поширені 2 представники роду *Vinca L.*: *V. minor L.* та *V. herbacea WALDST. ET KIT.* [1]. В межах області вони трапляються рідко і занесені до списку регіонально рідкісних та мало поширених видів рослин Полтавщини. Протягом 2004-2007 рр. ми вивчали особливості поширення цих видів у Полтавському районі. В результаті було знайдено по одній численній популяції кожного виду.

V. minor L. поширений у широколистяних лісах. За Д.С. ІВАШИНИМ [3], цей вид утворює місцями густі зарості на схилах річкових долин і прилеглих балок у дубових та грабово-дубових лісах. Численну групу особин нам вдалося виявити в корінному листяному лісі Розсошанського лісництва за с. Тютюнники (правий берег річки Ворскла). Також цей вид наводиться для південної частини Полтавського району – урочище Вільшани [2], але в цьому місці нам виявити його не вдалося.

V. herbacea WALDST. ET KIT. на відміну від попереднього, поширений на степових схилах, переважно в південній частині Полтавщини. Для околиць Полтави відомі давні знахідки, що стосуються кінця XIX ст. і, мабуть, не збереглися [4]. Але у 2007 р. ми знайшли *V. herbacea* на степових схилах південної експозиції в околицях сіл Мачухи, Снопове та Сердюки, де розміщені густі зарості на площі близько 0,5 га.

Обидва види роду *Vinca L.* в межах Полтавського району потребують охорони, зокрема створення заказників шляхом оптимізації природно-заповідної мережі Полтавщини.

ЛІТЕРАТУРА

1. БАЙРАК О.М. 1997. Конспект флори Лівобережного Придніпров'я. Судинні рослини. – 164 с. Полтава, Верстка.
2. БАЙРАК О.М., СТЕЦЮК Н.О. 2005. Атлас рідкісних і зникаючих рослин Полтавщини. – 248 с. Полтава, Верстка.
3. ІВАШИН Д.С., ГАНЖА Р.В., СТАСІЛЮНАС О.А., ГОЛОВА Т.П., ЛИТВИНОВА М.Д. 1985. Рідкісні рослини південно-східної частини Лівобережного Лісостепу України. *Укр. ботан. журн.* 42 (1). – С. 71-75.
4. ІЛПЧЕВСЬКИЙ С.О. 1927. Флора околиць Полтави (з повним списком дикої рослинності). – 32 с. Полтава, Полтава-поліграф, 1-ша рад друк.